

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO

OÍDIO

A previsão meteorológica aponta para alguma instabilidade climática para os próximos dias.

Nesta fase de grande sensibilidade, as vinhas devem manter-se protegidas preventivamente até ao fecho do cacho / início do pintor. Deve realizar os tratamentos de acordo com a persistência de ação dos fungicidas, e ter o cuidado de alternar as famílias químicas dos produtos e não ultrapassar o número de aplicações permitidas por ano.

Não devem ser descuradas as despontas e despampas, de modo a que a vegetação permita o arejamento da zona dos cachos e a boa penetração da calda fungicida.

TRAÇA DA UVA

Teve já início o voo que irá originar a segunda geração da praga, mas é ainda cedo para efetuar qualquer tratamento.

Nesta fase, o Sr. Viticultor devesse efetuar a monitorização da praga nas suas parcelas de vinha através de armadilhas com atrativos sexuais e deverá efetuar a Estimativa do Risco, contando o número de ovos e/ou perfurações existentes em 100 cachos (em 50 cepas escolhe ao acaso 2 cachos por cepa).

Nota

Para contrariar o desenvolvimento das doenças e aumentar a eficácia dos tratamentos é muito importante que a vegetação seja corretamente orientada.

Estas operações culturais, despontas e despampas, promovem o arejamento do interior da sebe e facilitam a penetração da calda fungicida.

MÍLDIO

De uma forma geral, o míldio tem-se manifestado de forma reduzida e apenas nas parcelas mais abrigadas, principalmente no Baixo Corgo.

Para os locais onde não foram, ainda, observados sintomas da doença, deve manter a vigilância das parcelas.

Nas vinhas em que for realizado o tratamento contra o oídio, poderá ser adicionado à calda um fungicida penetrante. Onde já existem cachos fechados pode recorrer a misturas à base de cobre.

PODRIDÃO NEGRA (Black Rot)

Nas vinhas onde existam manchas da doença, na escolha do fungicida, deverá ter o cuidado de selecionar os fungicidas anti-oídio ou anti-míldio que possuam também eficácia contra o Black Rot.

Os fungicidas homologados para a cultura da vinha, devem ser consultados no site da DGAV: SIFITO - Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos - [Sifito \(dgav.pt\)](http://Sifito(dgav.pt)).

AVISOS AGRÍCOLAS ESTAÇÃO DE AVISOS DO DOURO

Sr. Viticultor:

Tendo como objetivo minimizar os prejuízos provocados pela queda de granizo, aconselhamos a adoção das seguintes medidas:

1) TRATAMENTO

- Aconselhamos a imediata realização de um tratamento anti-míldio e anti-oídio, adicionando à calda um adubo foliar com elevada percentagem de cálcio. O tratamento será tanto mais eficaz quanto mais rapidamente for efetuado.

Nota: Não deverá ser utilizado cobre por causar maior stress às plantas, nem fosecil de alumínio por ser incompatível com alguns adubos foliares.

2) INTERVENÇÕES NA VEGETAÇÃO

- De acordo com o grau de afetação das videiras, aconselhamos as seguintes intervenções:

Estado da Videira	Forma de Intervenção
Videira afetada apenas na zona superior	Desponta do último terço dos pâmpanos
Videira pouco afetada	Desponta e poda seletiva eliminando os pâmpanos mais danificados
Videira muito afetada	Não fazer qualquer intervenção